

【悪性リンパ腫レジメン】

レジメン番号	1702300100	1クール:21日	
レジメン名	CHOP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソリューゲンF500mL	div・6時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+アドリアシン50mg/m ²	div(側)・30分	day1
4	生食50mL+オンコピン1.4mg/m ² (max2mg)	div(側)・15分	day1
5	生食250mL+エンドキサン750mg/m ²	div(側)・90分	day1
6	プレドニゾロン100mg/body	po or div	day1-5
7	イメンド	po	day1-3

レジメン番号	1702300200	1クール:21日	
レジメン名	R-CHOP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・6時間	day1
2	生食500mL+リツキサン375mg/m ²	div(側)	day1
	リツキサン投与30分前にブルフェン(100)2錠/分1、ポラミン(2)1錠/分1を服用		
3	ソリューゲンF500mL	div・6時間	day2
4	生食100mL+アロキシ0.75mg	div(側)・30分	day2
5	生食100mL+アドリアシン50mg/m ²	div(側)・30分	day2
6	生食50mL+オンコピン1.4mg/m ² (max2mg)	div(側)・15分	day2
7	生食250mL+エンドキサン750mg/m ²	div(側)・90分	day2
8	プレドニゾロン100mg/body	po or div	day1(2)-5(6)
9	イメンド	po	day2-4

レジメン番号	1702300210	1クール:21日	
レジメン名	R-CHOP(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・5時間	day1
2	生食500mL+リツキサン375mg/m ²	div(側)	day1
	リツキサン投与30分前にブルフェン(100)2錠/分1、ポラミン(2)1錠/分1を服用		
3	生食100mL+アロキシ0.75mg	div(側)・30分	day1
4	生食100mL+アドリアシン50mg/m ²	div(側)・30分	day1
5	生食50mL+オンコピン1.4mg/m ² (max2mg)	div(側)・全開	day1
6	生食250mL+エンドキサン750mg/m ²	div(側)・90分	day1
7	プレドニゾロン100mg/body	po or div	day2-6
8	イメンド	po	day1-3

レジメン番号	1702300300	1クール:21日	
レジメン名	リツキサン		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・6時間	day1
2	生食500mL+リツキサン375mg/m ²	div(側)	day1
	リツキサン投与30分前にブルフェン(100)2錠/分1、ポラミン(2)1錠/分1を服用		